



หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนร่วมใจ...ต้านภัยมะเร็งตับ

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันตับอักเสบโลก” ตับ เป็นอวัยวะที่สำคัญ มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย โดยในผู้ใหญ่ตับจะมีขนาด ๑ ใน ๕๐ ของน้ำหนักตัว ด้วยว่าต่ำ หากท่านหนัก ๕๐ กิโลกรัม ตับของท่านจะมี ขนาดหนักประมาณ ๑ กิโลกรัม ปัญหาของโรค ไวรัสตับอักเสบเป็นประเทศไทย เป็นโรคที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นกับตับ และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งตับ ในประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเปรี้ยว ร้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประชากร หรือกว่า ๓ ล้านคน และเมื่อกล่าวถึงมะเร็งตับ มีชายไทยป่วยเป็นมะเร็งตับอันดับ ๑ ของผู้ป่วยมะเร็งชาย และผู้หญิงป่วยด้วยมะเร็งตับเป็นอันดับ ๓-๔ ของผู้ป่วยมะเร็งหญิง

โรคไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบบีเป็น DNA ไวรัสขนาดเล็ก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปอยู่ในตับ และมีการตายของเซลล์ตับ หากโรคหายร่างกายสามารถควบคุมได้และมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น ตับอาจกลับสู่ภาวะปกติ แต่ผู้ป่วยบางรายไม่หายเป็นเรื้อรัง จนทำให้เกิดการตายของเซลล์ตับจำนวนมาก ตามด้วยแผลเป็นพังผืดจนเป็นตับแข็ง หากไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่การเกิดตับวายและมะเร็งตับในที่สุด การติดต่อ ติดต่อทางเลือด น้ำเหลือง หรือน้ำคัดหลังของผู้ติดเชื้อ การติดต่อจากแม่สู่ลูก การติดต่อระหว่างบัดແຜลงองเด็กๆ ด้วยกัน หรือการสักผิวหนัง เป็นต้น การป้องกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน สามารถป้องกันการติดเชื้อได้โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องฉีดให้ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด เพื่อกระตุนให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ โดยในปัจจุบันจะมีวัคซีนฉีดในเด็กแรกเกิดทุกราย วิธีการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่มีการรักษา ๒ แบบ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เลวร้ายลงและป้องกันโรคแทรกซ้อนที่ อันตรายถึงชีวิต คือ การใช้ยาอินเทอเฟอรอนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ และการใช้ยาต้านเชื้อไวรัสซึ่งลดการเพิ่มจำนวนไวรัส หรือรักษาระดับไวรัสในเลือดให้ต่ำที่สุด โรคนี้เป็นโรคที่ผู้ป่วยต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิต และควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ซึ่งป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับได้

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวต่อว่า ควรปฏิบัติตั้งนี้ (๑). ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ (๒). ไม่ใช้อุปกรณ์สัก เจาะ ขลิบ เข็มฉีดยา หรือของมีคมร่วมกัน (๓). ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรค (๔). ไม่ปล่อยให้อ้วนลงพุง อาจทำให้ไขมันแทรกตับ เป็นตับอักเสบ (๕). ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณมาก ติดต่อกันเป็นเวลานาน (๖). ไม่กินอาหารที่มีสารอัลฟາಥอกซิน พบรากในอาหารแห้งชิ้นๆ เช่น ถั่วป่น พริกแห้ง ถั่วลิสง ข้าว แป้ง กุ้งแห้ง ปลาแห้ง ข้าวโพด ห้อม กระเทียม เป็นต้น (๗). ไม่กินปลาดิบเนื้อจีดที่มีเกร็ด เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาชิว ปลาสร้อย ปลาแม่น้ำแดง เพราะอาจมีพยาธิไปไม้ในตับทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับ (๘). กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (๙). ตรวจสุขภาพตับสม่ำเสมอ ทุก ๖ – ๑๒ เดือน

“ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ”