



## หมวดใหญ่กรุงเก่า : แนะนำชนิดแลบุตรหลาน ป้องกันเด็กจนน้ำตาลัยในช่วงฤดูร้อน

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ ๔๐๐ คน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของการจนน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี

จากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงของฤดูกาลปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง บางครอ卜ครัวต้องเผชิญกับความสูญเสียจากสาเหตุที่บุตรหลานเสียชีวิตจากการจนน้ำ ซึ่งการจนน้ำตาลัยในเด็กสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น ๓ ชนิด ชนิดที่ ๑ “ผลอเรอชั่วขณะ” เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กมีอายุระหว่าง ๖ เดือน – ๓ ขวบ มีผู้ดูแลใกล้ชิดแต่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก ที่คิดว่าการหันไปทำกิจกรรมเพียงระยะเวลาสั้นๆ คงไม่ทำให้เด็กเกิดอันตรายได้ ซึ่งแท้จริงแล้ว การทำกิจกรรมบางอย่างในระยะเวลาสั้นๆ เพียงเสี้ยววินาที เช่น การหันไปชงนม เข้าห้องน้ำ รวมทั้งการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ก็เป็นสาเหตุทำให้เด็กเกิดอันตรายและอาจจนน้ำเสียชีวิตได้ ชนิดที่ ๒ “ไม่คิดว่าจะแกะบ้านจะอันตราย สำหรับเด็ก” เช่น กระลัง ถังน้ำ โลง อ่างเลี้ยงปลา อ่างบัว มักพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ถึงร้อยละ ๔๗ อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ระหว่าง ๒ - ๑๐ ขวบ เด็กมักมีผู้ดูแลแต่ไม่ตลอดเวลา ผู้ดูแลเด็กประมาณ ๕๖% ไม่คิดว่าสิ่งแวดล้อมในบ้าน รอบบ้าน หรือจะแกะบ้านจะเป็นอันตราย จึงอนุญาตให้เด็กเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ชนิดที่ ๓ “สาเหตุจากการเล่นน้ำหรือว่ายน้ำ” ในแหล่งน้ำบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น แม่น้ำ ร่องน้ำ คูน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำในชุมชน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิตมากอยู่ระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี ส่วนใหญ่เด็กที่จนน้ำชนิดนี้จะสามารถว่ายน้ำได้แต่ยังไม่แข็ง

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวว่า “เพื่อให้บุตรหลานปลอดภัยจากการจนน้ำ จึงขอให้ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเด็กควรตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการกำจัดปัจจัยเสี่ยงด้วยการระบายน้ำหรือเทเน้าในภาชนะที่ไม่ใช่ห้องน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้เรียบร้อย สร้างแนวหรือรั้วกันพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรู้สึกห่าไม่ถึงการณ์ขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าระดับน้ำเพียง ๑ - ๒ นิ้ว ก็สามารถทำให้เด็กจนน้ำได้ ไม่ปลอดภัยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง สอนให้รู้จักใช้เสื้อชูชีพตลอดเวลาเมื่อโดยสารเรือ แนะนำวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแก่เด็ก เช่น การลอยตัวแบบนอนคว่ำ หรือนอนหงาย สอนการใช้ชุดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาช่วยในการลอยตัว รวมถึงการช่วยเหลือคนจนน้ำที่ถูกต้อง โดยการไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ตะโกนเรียกผู้ใหญ่หรือใช้อุปกรณ์ช่วยยืนหรือโynon เช่น กิ่งไม้ เชือก ห่วงยาง

หากพบเด็กจนน้ำ ห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่าหรือวางในลักษณะกระ高峰期เพื่อเอาน้ำออก เพราะเป็นวิธีที่ผิดและจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจยิ่งขึ้น หากเด็กไม่หายใจต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการเป่าปากและนวดหัวใจทันที พระหากกปล่อยให้สมองขาดออกซิเจนเพียง ๔ - ๕ นาที ก็จะทำให้สมองสูญเสียสภาพได้ทั้งน้ำเพื่อช่วยให้เด็กจนน้ำรอดชีวิตได้ทันท่วงที ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สามารถโทร. ๑๖๖๙ เพื่อรีบกรณพยาบาลได้ฟรี