



หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะนำชนดูแลบุตรหลาน ป้องกันเด็กจนน้ำตาลัยในช่วงฤดูร้อน

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เฉลี่ยประมาณ ๔๐๐ คน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของการจนน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือน มีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ โดยในปี ๒๕๖๐ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม

จากสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงของฤดูกาลเรียนที่กำลังจะมาถึง บางครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสียจากสาเหตุที่บุตรหลานเสียชีวิตจากการจนน้ำ ซึ่งการจนน้ำตาลัยในเด็กสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น ๓ ชนิด ชนิดที่ ๑ “ผลอเรอช้ำขณะ” เด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กมีอายุระหว่าง ๖ เดือน – ๓ ขวบ มีผู้ดูแลใกล้ชิดแต่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ที่คิดว่าการหันไปทำกิจกรรมเพียงระยะเวลาสั้นๆ คงไม่ทำให้เด็กเกิดอันตรายได้ ซึ่งแท้จริงแล้วการทำกิจกรรมบางอย่างในระยะเวลาสั้นๆ เพียงเสี้ยววินาที เช่น การหันไปชงนมเข้าห้องน้ำ รวมทั้งการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ก็เป็นสาเหตุทำให้เด็กเกิดอันตรายและอาจจนน้ำเสียชีวิตได้ ชนิดที่ ๒ “ไม่คิดว่าจะแกบ้านจะอันตรายสำหรับเด็ก” เช่น กำลังมั่ง ถังน้ำ โลง อ่างเลี้ยงปลา อ่างบัว มักพบว่า เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๗ อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ระหว่าง ๒ - ๑๐ ขวบ เด็กมักมีผู้ดูแลแต่ไม่ตลอดเวลา ผู้ดูแลเด็กประมาณไม่คิดว่าสิ่งแวดล้อมในบ้าน รอบบ้าน หรือลักษณะบ้านจะเป็นอันตราย จึงอนุญาตให้เด็กเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ชนิดที่ ๓ “สาเหตุจากการเล่นน้ำหรือว่ายน้ำ” ในแหล่งน้ำบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น แม่น้ำ ร่องน้ำ คูน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำในชุมชน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อายุเฉลี่ยของเด็กที่เสียชีวิตมากอยู่ระหว่าง ๕ - ๑๔ ปี ส่วนใหญ่เด็กที่จนน้ำชนิดนี้สามารถว่ายน้ำได้แต่ยังไม่แข็ง

นพ.พิทยาฯกล่าวต่อว่า เพื่อให้บุตรหลานปลอดภัยจากการจนน้ำ จึงขอให้ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเด็กควรตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการทำจัดปัจจัยเสี่ยงด้วยการระยะห่างน้ำในภายนอกที่ไม่ใช่ทึ่ง ปิดฝาภายนอกที่บรรจุน้ำให้เรียบร้อย สร้างแนวหรือรั้วกันพื้นที่ที่ไม่ปลดภัยสำหรับเด็กและเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไมถึงการณ์ของเด็กน้อยอยู่เสมอว่าจะดับน้ำเพียง ๑ - ๒ นิ้ว ก็สามารถทำให้เด็กจนน้ำได้ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง สอนให้รู้จักใช้เสื้อชูชีพตลอดเวลาเมื่อโดยสารเรือ แนะนำวิธีการว่ายน้ำเพื่ออาชีวกรดแก่เด็ก เช่น การloyตัวแบบนอนคว่ำ หรือนอนหงาย สอนการใช้ชุดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาช่วยในการลอยตัว รวมถึงการช่วยเหลือคนจนน้ำที่ถูกต้อง โดยการไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ตะโหนเรียกผู้ใหญ่หรือใช้อุปกรณ์ช่วยยืนหรือโยน เช่น กิ้งไม้ เชือก ห่วงยาง

หากพบเด็กจนน้ำ ห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่าหรือวางในลักษณะกระทะกระทะว่าเพื่อเอาน้ำออก เพราะเป็นวิธีที่ผิดและจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจยิ่งขึ้น หากเด็กไม่หายใจต้องทำการปฐมพยาบาลด้วยการเป่าปากและนวดหัวใจทันที เพราะหากปล่อยให้สมองขาดออกซิเจนเพียง ๔ - ๕ นาที ก็จะทำให้สมองสูญเสียสภาพได้ทั้งน้ำเพื่อช่วยให้เด็กจนน้ำรอดชีวิตได้ทันท่วงที ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์สามารถโทร. ๑๖๖๙ เพื่อเรียกรถพยาบาลได้ฟรี