



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



6 ต.ค. 2565 14:03 น.

ข่าว > การเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

12 ต.ค. ดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิดเด็ก 6 เดือน-4 ขวบ ไฟเซอร์ฝาแดงเข้มถึงไทยพรุ่งนี้

สธ. ชักซ้อมแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก 6 เดือน ถึง 4 ขวบ ดีเดย์ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ 12 ต.ค. 65 วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้มถึงไทยพรุ่งนี้

วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมามีโรคโควิด-19 ได้ปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การควบคุมโรคประสบความสำเร็จ คือ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ปัจจุบันฉีดไปแล้วกว่า 143 ล้านโดส ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะขยายการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งจะคิกออฟวันที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จึงมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนเด็กกลุ่มดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างปลอดภัย สำหรับกลุ่มอื่นๆ พบว่าเมื่อโรคลดความรุนแรงลง ทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนลดลงตามไปด้วย

“ขอย้ำว่าเข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็น ขอให้ฉีดกระตุ้นอย่างน้อย 4 เดือนจากเข็มล่าสุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ควรรับถึงเข็มที่ 4 โดยขอให้พื้นที่ช่วยกันรณรงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2565”

ทางด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยวิวัฒน์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข็มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี จะมาถึงในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เพื่อให้กระจายต่อในพื้นที่ตามจำนวนที่มีการแจ้งความประสงค์ และเริ่มคิกออฟพร้อมกันวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ขณะนี้มีผู้ปกครองสมัครใจให้เด็กรับวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก โดยสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนพื้นฐานชนิดอื่นได้



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ขณะที่ นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันเด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี เป็นกลุ่มเดียวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งช่วงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) พบว่าเด็กกลุ่มนี้มีอาการป่วยและอัตราเสียชีวิตสูงกว่าเด็กโต 3 เท่า สำหรับการชั่งชั่งวันนี้เน้นย้ำให้ฉีดวัคซีนตามแนวทาง

“ในเด็กเล็กจะใช้ปริมาณวัคซีนน้อยลง คือขนาด 3 ไมโครกรัม จำนวน 0.2 มิลลิกรัม ฉีด 3 เข็ม เข็มที่สองห่างจากเข็มแรก 1 เดือน และเข็มที่สาม ห่างเข็มที่สอง 2 เดือน หลังฉีดให้สังเกตอาการ 30 นาที และติดตามต่อจนครบ 1 เดือน โดยให้จัดจุดบริการแยกจากกลุ่มวัยอื่น เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้วัคซีน”

สำหรับข้อกังวลเรื่องผลข้างเคียง สหรัฐอเมริกามีการฉีดและติดตามส่วนกว่าโคส พบผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโต ไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิต ถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะมิสซี (MIS-C) จากการติดเชื้อด้วย อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าหลังจากนี้มีการผ่อนคลายต่างๆ จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก แต่วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ง่าย เมื่อเด็กไม่ป่วย พ่อแม่ผู้สูงอายุในบ้านจะลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



6 ต.ค. 2565 09:52 น.

ข่าว > กัวไทย > กณ. | ไทยรัฐฉบับพิมพ์

**ปกเข็มแรก 12 ต.ค.วัคซีนโควิดเด็กเล็ก ย้ำสมัครใจไม่
เป็นเงื่อนไขขอเข้า s.s.**

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวง
ว่า ได้กำชับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้นในประชากรกลุ่ม 608 เพราะผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ส่วน
การฉีดวัคซีนในเด็กเล็กจะเริ่มฉีดเข็มแรก วันที่ 12 ต.ค. ที่ รพ.พระนั่งเกล้า



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ค.ปี 2565 พบผู้ป่วยโควิดเป็นเด็กอายุ 0-4 ปี จำนวน 3.6 แสนราย จำนวนนี้ต้องนอน รพ.เกือบ 1 แสนราย มีอาการปอดบวมรุนแรงเกือบ 1 พันราย เสียชีวิต 65 ราย อัตราเสียชีวิต 0.01% ประมาณ 1 ในหมื่น แม้ไม่มากแต่ก็ถือเป็นความสูญเสีย เป็นโอกาสดีที่จะมีวัคซีนเด็กเล็ก ซึ่งจะฉีดสัปดาห์หน้า

ขณะที่ **พญ.ปิยนิตย์ ธรรมากรณ์พิลาศ** แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปี เป็นฝาแดงเข็ม 1 ขวดบรรจุ 10 โดส ขนาดฉีด 0.2 มิลลิลิตร ฉีด 3 เข็ม เข็ม 1 ห่างเข็ม 2 ระยะ 3-8 สัปดาห์ แนะนำที่ 4 สัปดาห์ เข็ม 2 ห่าง 3 ระยะ 8 สัปดาห์ขึ้นไป มีการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดไปแล้วพบมีความปลอดภัยดี อาการข้างเคียงไม่รุนแรง เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวด บวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง ประสิทธิภาพวัคซีนต่อสายพันธุ์โอมิครอนหลังฉีดครบ 3 เข็มไปแล้วอย่างน้อย 7 วันให้ประสิทธิภาพ 75-80% แนะนำทุกคนควรฉีด โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว ที่เสี่ยงป่วยรุนแรง การรับวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจและไม่เป็นเงื่อนไขการไปโรงเรียน กรณีเด็กฉีดเข็ม 1 อายุ 4 ปีกว่า แต่เข็ม 2 อายุเกิน 5 ปีให้ฉีดไฟเซอร์ ฝาส้มสำหรับเด็ก 5-11 ปี ระหว่างฉีดแล้วติดโควิดให้เว้นระยะไป 3 เดือนค่อยฉีด เข็มต่อไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงแนวทางดูแลรักษาโควิด-19 ว่า ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกวัน ตรวจเมื่อมีอาการ หากมีผลเป็นบวก และมีอาการเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัส หรือกินยาตามอาการ เช่น ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอ และสังเกตอาการ หากมีไข้สูง เจ็บหน้าอก ให้พบแพทย์ประเมินการรักษา กรณีผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย แนะนำควรหยุดงานหรือกักตัวอยู่บ้าน 5 วัน ถ้าจำเป็นต้องเดินทางหรือทำงาน ควรป้องกันตัวเอง ร้อยเปอร์เซ็นต์ สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือตลอดเวลา อยู่ห่างคนอื่น แยกกินอาหาร ปฏิบัติตัวเช่นนี้แบบเข้มข้น 5 วัน.



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3270079

เด็กเล็กติดโควิดพุ่ง กุมารแพทย์แนะผู้ปกครองพาไปฉีดวัคซีนป้องกัน ยันปลอดภัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 - 13:52 น.



รศ. พญ.วนัภปริยา พงษ์สามารถ
ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เด็กเล็กติดโควิดพุ่ง กุมารแพทย์แนะผู้ปกครองพาไปฉีดวัคซีนป้องกัน ยันปลอดภัย

วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รศ.พญ.วนัภปริยา พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ให้แก่ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 5 ปี ขณะนี้พบจำนวนมาก และมีโอกาสติดเชื้อรุนแรง และเสียชีวิตได้ ประมาณร้อยละ 0.05 ดังนั้น เด็กกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องรับวัคซีนป้องกัน โดยการรับวัคซีนโควิด-19 เด็กกลุ่มนี้ จะเป็นวัคซีนชนิด mRNA เป็นไฟเซอร์ฝ่าสีแดงเข็ม ในเด็ก 1 คน จะต้องรับวัคซีน 3 เข็ม แบ่งเป็น เข็มที่ 1 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 1 เดือน, เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/news-monitor/news_3270079

"จากข้อมูลการรับวัคซีนในสหรัฐอเมริกา ที่มีการฉีดให้เด็กเล็กไปแล้ว 1.5 ล้านคน ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ รวมถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จากการรายงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความปลอดภัย ไม่แตกต่างกับการรับวัคซีนพื้นฐาน ทั้งคอตีบ ไอกรน ในเด็กเล็ก ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองวิตกกังวลว่า เด็กอาจเกิดอาการไม่สบายตัว หลังรับวัคซีนโควิด-19 ก็ต้องยอมรับว่า มีเหมือนวัคซีนชนิดอื่นทั่วไป โดยเด็กอาจร้องอแง หรือปวดที่จุดรับวัคซีนบาง แต่ไม่รุนแรง เพียง 1-2 วัน อาการก็กลับมาปกติ ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล" รศ.พญ.วันทปรียา กล่าว

รศ.พญ.วันทปรียา กล่าวว่า เทียบประโยชน์ของการรับวัคซีนกับการไม่ได้รับวัคซีน จะพบว่า การรับวัคซีนมีประโยชน์มากกว่า เนื่องจาก ช่วยลดความรุนแรง เมื่อมีการติดเชื้อโควิด ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (รพ.) ไม่ต้องเข้าไอซียู และยังลดทั้งภาวะมิสซี (MIS-C) ที่มักพบเกิดขึ้นในเด็กที่มีการติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ได้รับวัคซีนถึง 1 ใน 3,000 คน

"ทั้งนี้ ภาวะมิสซีที่พบ มักเกิดขึ้นหลังจากเด็กมีการหายป่วยจากโควิด-19 ไปแล้ว 2-8 สัปดาห์ และการเกิดอาการลองโควิด แม้ในเด็กเล็กจะยังไม่มียารายงานภาวะลองโควิดอย่างชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่ แต่เชื่อว่าช่วยลดการเกิดลองโควิดได้แน่นอน สำหรับอาการลองโควิดที่มักพบในเด็ก คือ บางคนขาดสมาธิ บางคนมีอาการไอเรื้อรังสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้โควิด-19 จะปรับเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้ว แต่ การติดเชื้อในเด็กทั้งเล็กและ โต ยังคงมีอยู่ โดยเป็นการตรวจพบจาก ATK ซึ่งหากพบว่า เด็กมีอาการไข้สูง 40-41 องศาเซลเซียส อย่างนั้นนอนใจ ให้รีบไปแพทย์ทันที" รศ.พญ.วันทปรียา กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>



ฉีดไฟเซอร์ฝาแดงเข็ม 6 เดือน-4 ปีชุดแรก 12 ต.ค. “อนุทิน” ลั่นไทยมีวัคซีนครอบคลุมทุกช่วงอายุ

“อนุทิน” ย้ำวัคซีนทุกชนิดผ่านการรับรองจาก อย. ขอให้มั่นใจมีวิชาการสนับสนุน ที่ผ่านมาฉีดปช.มากกว่า 75% ยังค้างเด็กเล็ก ล่าสุดไฟเซอร์ขยายอายุ 6 เดือน-4 ปี ทำให้ขณะนี้ไทยมีวัคซีนครอบคลุมทุกช่วงอายุ พร้อมคิกออฟฉีดเด็กเล็กล็อตแรก 12 ต.ค.65

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์ฝาสีแดงเข็ม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่า ยืนยันว่าการนำวัคซีน ยา หรือเวชภัณฑ์ใดก็ตาม ที่จะนำมารักษาโรคหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผ่านคณะกรรมการด้านวิชาการ คือ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เราจะไม่ใช่เชิงบริหารมาในการชี้แนะ เน้น หรือมาเหนือหลักวิชาการทางการแพทย์



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>

"ขอให้มั่นใจได้ว่า ทุกอย่างมีหลักวิชาการสนับสนุน เราปิดเกมได้ เพราะคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนมากกว่า 75% ที่ยังคงค้างคือเด็ก ซึ่งตอนนั้นยังไม่ครอบคลุม ตอนนี้ขยายอายุลงไปถึง 6 เดือนแล้ว อย่าบอกว่าเด็กไม่มีโอกาสติด เด็กมีโอกาสติดเชื้อสูงมาก จาก การไปโรงเรียนที่ต้องมีการเดินทาง ที่เรากลัวคือ แม้เขาติดเชื้อเด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่หากในบ้านมีผู้สูงอายุที่ยังไม่รับ วัคซีนด้วย เด็กก็เป็นตัวกระจายเชื้อได้" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเราจะทำให้ดีที่สุดคือ เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งวัคซีนโควิด 19 ที่ไทยมีครอบคลุมทุก ช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ทราบว่า ผู้ปกครองลงทะเบียนสมัครใจให้เด็กกลุ่มนี้ฉีดประมาณ 4 แสนราย ล็อตแรกของวัคซีน เด็กเรามี 5 แสนโดส ก็จะสั่งเข้ามามากขึ้นถ้ามีความต้องการของผู้ปกครอง และสำคัญไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็ต้องฝาก ว่า ให้มารับวัคซีนกันถ้วนหน้า จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิตได้มาก ถ้ารับเข็ม 3 หรือ 4 แล้วแทบไม่เสียชีวิต เลย ก็จะมีความปลอดภัยแม้จะติดเชื้อ

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดในกลุ่มเด็ก โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 10 ไมโครกรัม ด้วยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน สำหรับปริมาณการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี นั้น จะใช้วัคซีนโดสละ 0.2 มิลลิกรัม (3 ไมโครกรัม) ฉีด 3 เข็ม โดยเข็ม 2 ห่างจากเข็ม 1 ประมาณ 3 สัปดาห์และเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 8 สัปดาห์

โดยสามารถฉีดวัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีนพื้นฐานของเด็กเล็กได้ ส่วนเด็กที่มีประวัติติดเชื้อโควิดให้เว้นระยะห่าง 3 เดือนนับ ตั้งแต่พบเชื้อ อีกทั้ง กรมควบคุมโรคยังแนะนำให้เด็กทุกคนควรเข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิตตามข้อแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี เด็ก คลอดก่อนกำหนด โรคอ้วน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ ณ ปัจจุบัน มีฉีดแล้วด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้ 1. ไฟเซอร์ฝ่าสีม่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นสูตรเดิมผสมน้ำเกลือ 2. ไฟเซอร์ฝ่าสีเทา สูตรใหม่ไม่ต้องผสมน้ำเกลือ และ 3. ไฟเซอร์ฝ่าสีส้มอายุ 5-11 ปี ส่วนแบบที่ 4 ล่าสุดเป็นไฟเซอร์ฝ่าแดงเข้มสำหรับอายุ 6 เดือน - 4 ปี



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>



กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงฝนตก น้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...พร้อมแนะหากมีอาการป่วยไม่ควรซื้อยาลดไข้ ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) มารับประทานเอง และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกัน ลดจำนวนยุงลาย โดยปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ

- เก็บบ้าน**
เก็บบ้านให้สะอาด
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน
ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดส่องสว่าง
ไม่มีมุมอับชื้นเป็นที่เกาะพักของยุง
- เก็บขยะ**
เก็บขยะบริเวณรอบบ้าน
ไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- เก็บน้ำ**
ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด
จัดการขยะไม่ให้มีน้ำขัง
เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
ป้องกันยุงลายวางไข่

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ต.ค. 65

Hfocus @hfocusnews Hfocus.org